



## 気になる症状をチェック

レノックス・ガストー症候群の患者さんには、さまざまなタイプのでんかん発作がみられ一般に使用される抗てんかん薬ではコントロールできないことがあり、次第に発達の遅れや運動失調が現れます。

お子さんの症状が気になる方は、こちらの項目をチェックしたうえで、結果についてかかりつけ医にご相談ください。

### チェックリスト

以下の項目に当てはまるがありましたか？

- Q1 初めててんかん発作を起こしたのは、12歳未満のときであった  
(初めて発作を起こした年齢 歳)

---

- Q2 複数のタイプの発作がみられる

---

- Q3 精神発達遅滞がみられる

---

- Q4 身体が固くなる発作を起こしたことがある。  
また、睡眠時に目を開いて眼球が上転する、口を開ける、腕が上がるなどの発作がみられる(強直発作)

---

- Q5 身体を支えている筋肉の緊張が突然低下・消失し、崩れるように倒れてしまう発作がみられる(脱力発作)

---

- Q6 数十秒間にわたりぼーっとする、話しかけても反応しない、目をパチパチするなどの発作がみられる(非定型欠神発作)

### 注意

レノックス・ガストー症候群は、遺伝子検査や脳波、MRI検査などさまざまな検査の結果から診断されます。

上記のチェック項目だけでは判断できないため、必ずかかりつけ医などに相談するようにしてください。



Lennox-Gastaut syndrome 治療情報サイト

レノックス・ガストー症候群と、あゆむ

<https://www.nippon-shinyaku.co.jp/healthy/lennox-gastaut-syndrome/>