

## レフトーゼシロップ 0.5%

### 【この薬は？】

販売名	レフトーゼシロップ 0.5% Leftose syrup 0.5%
一般名	リゾチーム塩酸塩 Lysozyme Hydrochloride
含有量 (1mL 中)	5mg (力価)

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」  
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、卵白由来の消炎酵素剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、炎症による腫れを抑えたり、鼻汁や痰を分解して出しやすくします。
- ・次の病気の人に処方されます。

**痰の切れが悪く、喀出回数の多い下記疾患の喀痰喀出困難**

**気管支炎、気管支喘息、気管支拡張症**

**次の疾患の腫脹の緩解**

**慢性副鼻腔炎**

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にレフトーゼシロップ 0.5%に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- ・卵白アレルギーのある人

○次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・アトピー性皮膚炎、気管支喘息、薬剤アレルギー、食物アレルギー等のアレルギー症状を経験したことがある人
- ・両親、兄弟などが過去にアレルギー症状を経験したことがある人

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、症状などに合わせて、医師が決めます。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

対象	2歳未満	2～6歳	7～14歳
1日量	3～6mL	6～8mL	8～12mL
飲む回数	1日量を3回に分けて飲みます		

### ●どのように飲むか？

決められた1回量を飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・乳児にレフトーゼシロップ 0.5%を初めて飲ませた時に、ショックなどのアナフィラキシー反応がおこったという報告があります。皮膚が赤くなる、顔のほてり、じんましん、眼がはれぼったい、顔のむくみ、顔がはれぼったい、息苦しい、息切れ等の症状があらわれた場合には、飲ませるのを中止し、ただちに受診してください。保護者の方は、初めてレフトーゼシロップ 0.5%を飲ませる前に十分に理解できるまで説明を受けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意ください。重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
ショック ショック	めまい、頭痛、立ちくらみ
アナフィラキシー 様症状 アナフィラキシーようしょうじょう	しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、じんましん、判断力の低下、動悸（どうき）、息切れ、息苦しい、からだがだるい、考えがまとまらない、ほてり、意識の低下、ふらつき
中毒性表皮壊死融 解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN) ちゅうどくせいひょうひえ しゅうかいしょう (トキ シツクエビダーマルネクロ リシス: テン)	関節の痛み、痛みのある赤い肌、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、からだがだるい
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) ひふねんまくがんしょうこうぐん (スティーブンス- ジョンソンしょうこうぐん)	高熱、陰部の痛み、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、発熱、中央にむくみをともなった赤い斑点、赤い発疹（ほっしん）、まぶたや眼の充血、食欲不振、からだがだるい、結膜のただれ

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	立ちくらみ、からだがだるい、ふらつき、高熱、発熱、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）
頭部	めまい、頭痛、考えがまとまらない、意識の低下
顔面	ほてり
眼	眼と口唇のまわりのはれ、まぶたや眼の充血、結膜のただれ
口や喉	しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、ひどい口内炎、唇や口内のただれ
胸部	動悸（どうき）、息切れ、息苦しい
腹部	食欲不振
手・足	関節の痛み
皮膚	じんましん、中央にむくみをともなった赤い斑点、赤い発疹（ほっしん）、痛みのある赤い肌、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）
その他	判断力の低下、陰部の痛み

## 【この薬の形は？】

形状	シロップ剤
色	無色澄明

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	日局リゾチーム塩酸塩
添加物	D-ソルビトール液、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、pH調整剤

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・飲み終わったらふたをしっかりと閉めて保管してください。
- ・病院や薬局でシロップ剤を飲みやすいようにうすめて渡される場合があるので、そのような場合には、保管方法は病院、薬局の指示にしたがってください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

販売会社：日本新薬株式会社 (<http://www.nippon-shinyaku.co.jp/>)

くすり相談窓口

電話番号：075-321-9064

受付時間：9時～17時30分

（土、日、祝日、その他当社の休業日を除く）